

### Estudo de Tempo de Trânsito do Côlon com marcadores radiopacos

Trata-se de um método de estudo que permite a avaliação separada do tempo de trânsito nos diferentes segmentos cólicos.

A técnica de Bouchoucha consiste em:

- Toma diária, durante seis dias, sempre no mesmo horário, de uma cápsula contendo 10 marcadores radiopacos;
- Realização de uma radiografia abdominal simples, no 7º dia, à mesma hora da toma dos marcadores.

#### **Muito importante:**

**desde o primeiro dia da toma dos marcadores até à realização do raio-x abdominal o doente não poderá tomar qualquer tipo de laxante ou proceder à aplicação de enema.**

Poderá manter a sua alimentação e medicação habituais.

Início da toma: 1º dia ( \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) às \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas\*

Fim da toma: 6º ( \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) dia às \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas\*

Raio-X abdominal simples (sem relatório): 7º dia ( \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) às \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas  
O Raio-X deverá ser realizado na posição de supino, e conter desde o abdomen até à pelve.

\*Nota: a toma dos marcadores deverá coincidir sempre com a hora da realização do raio-x, por exemplo, se o raio-x for agendado para as 16h, a toma dos marcadores deverá ocorrer também pelas 16h.

#### **Raio X a realizar em:**

Hospital CUF Trindade

Morada: Rua da Trindade 61 / 4000-235 Porto

Telefone: 22 207 59 00

Após realização do raio-x solicitamos a entrega presencial do mesmo na ManopH para a elaboração do relatório.

**Se estes cuidados não forem tomados o resultado não será válido.**